Compito di ANALISI MATEMATICA 6/6/2025

I M 1) Se $z = \frac{3-i}{1-2i}$, calcolare $\sqrt[3]{z}$.

$$\text{Sarà } z = \frac{3-i}{1-2i} \cdot \frac{1+2i}{1+2i} = \frac{3+6i-i+2}{1+4} = \frac{5+5i}{5} = 1+i.$$

Essendo $1+i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} i \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ avremo:

$$\sqrt[3]{1+i} = \sqrt[6]{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} + k \frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} + k \frac{2\pi}{3} \right) \right), 0 \leq k \leq 2.$$

Se $k = 0$: $\sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$;

$$\begin{aligned} \text{se } k = 1: & \sqrt[6]{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{3} \right) \right) = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{9\pi}{12} + i \sin \frac{9\pi}{12} \right) = \\ & = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = \sqrt[6]{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = -\frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} i; \end{aligned}$$

$$\text{se } k = 2: \sqrt[6]{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{4\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} + \frac{4\pi}{3} \right) \right) = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{17\pi}{12} + i \sin \frac{17\pi}{12} \right).$$

I M 2) Verificare se la funzione $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ risulta continua nel punto $(0, 0)$, e se del caso verificare poi se essa fosse anche differenziabile in $(0, 0)$.

Valutiamo se la funzione è continua in $(0, 0)$. Passando a coordinate polari avremo:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^2}{x^2 + y^2} \Rightarrow \lim_{\varrho \rightarrow 0} \frac{\varrho^2 (\varrho \cos^3 \vartheta + \sin^2 \vartheta)}{\varrho^2} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho \cos^3 \vartheta + \sin^2 \vartheta = \sin^2 \vartheta$$

e quindi il limite vale 0 solo per particolari valori di ϑ per cui la funzione non è continua e quindi neppure differenziabile in $(0, 0)$.

I M 3) Data l'equazione $f(x, y) = x^2 e^y - y e^x = 0$ soddisfatta nel punto $(1, 1)$, verificare se con essa si possa definire, in un intorno opportuno, una funzione $y = y(x)$ oppure una funzione $x = x(y)$. Di tale funzione calcolare nel punto opportuno derivata prima e seconda.

Da $\nabla f(x, y) = (2x e^y - y e^x; x^2 e^y - e^x)$ si ha $\nabla f(1, 1) = (2e - e; e - e) = (e; 0)$ ed essendo $f'_x(1, 1) = e \neq 0$ si può definire implicitamente una funzione $x = x(y)$, mentre essendo $f'_y(1, 1) = 0$ non si può definire implicitamente una funzione $y = y(x)$.

$$\text{Risulta } \frac{dx}{dy}(1) = -\frac{f'_y(1, 1)}{f'_x(1, 1)} = -\frac{0}{e} = 0.$$

Essendo $\mathbb{H}(x, y) = \begin{vmatrix} 2e^y - ye^x & 2xe^y - e^x \\ 2xe^y - e^x & x^2 e^y \end{vmatrix}$ sarà $\mathbb{H}(1, 1) = \begin{vmatrix} e & e \\ e & e \end{vmatrix}$. Dalla:

$$\frac{d^2 x}{dy^2} = -\frac{f''_{yy} + 2f''_{xy}(x') + f''_{xx}(x')^2}{f'_x} \text{ si ha:}$$

$$\frac{d^2 x}{dy^2}(1) = -\frac{e + 2(e)(0) + (e)(0)^2}{e} = -1.$$

Essendo $x'(1) = 0$ e $x''(1) = -1 < 0$, in tale punto abbiamo un punto di massimo.

I M 4) Data la funzione $f(x, y) = e^{x-\sqrt{3}y}$, determinare le direzioni $v = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ nelle quali risulta $\mathcal{D}_v f(0, 0) = 0$.

Essendo la funzione differenziabile, risulta $\mathcal{D}_v f(0, 0) = \nabla f(0, 0) \cdot (\cos \alpha, \sin \alpha)$.

Da $\nabla f(x, y) = (e^{x-\sqrt{3}y}, -\sqrt{3}e^{x-\sqrt{3}y})$ risulta $\nabla f(0, 0) = (1, -\sqrt{3})$ e quindi:

$$\mathcal{D}_v f(0, 0) = (1, -\sqrt{3}) \cdot (\cos \alpha, \sin \alpha) = \cos \alpha - \sqrt{3} \sin \alpha = 0 \Rightarrow \cos \alpha = \sqrt{3} \sin \alpha$$

$$\text{ovvero } \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \text{tg } \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} \text{ oppure } \alpha = \frac{7\pi}{6}.$$

II M 1) Risolvere il problema $\begin{cases} \text{Max/min } f(x, y) = 2x - y + 1 \\ \text{s.v.: } x^2 - 1 \leq y \leq 1 \end{cases}$.

Scriviamo il problema nella forma $\begin{cases} \text{Max/min } f(x, y) = 2x - y + 1 \\ x^2 - y - 1 \leq 0 \\ y - 1 \leq 0 \end{cases}$.

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 2 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ y = 1 \end{cases} \cup \begin{cases} x = -\sqrt{2} \\ y = 1 \end{cases}.$$

La funzione obiettivo del problema è una funzione continua, i vincoli definiscono una regione ammissibile $\mathcal{E}$ che è un insieme compatto, i vincoli sono qualificati, e quindi possiamo applicare il Teorema di Weierstrass e le condizioni di Kuhn-Tucker. Sicuramente la funzione ammette valore massimo e valore minimo.

Formiamo la funzione lagrangiana:

$$\Lambda(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = 2x - y + 1 - \lambda_1(x^2 - y - 1) - \lambda_2(y - 1).$$

Applicando le condizioni del primo ordine abbiamo:

1) caso $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$:

$$\begin{cases} \Lambda'_x = 2 \neq 0 \\ \Lambda'_y = -1 \neq 0 \\ x^2 - y \leq 1 \\ y \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \text{nessuna soluzione.}$$

2) caso $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 = 0$:

$$\begin{cases} \Lambda'_x = 2 - 2\lambda_1 x = 0 \\ \Lambda'_y = -1 + \lambda_1 = 0 \\ y = x^2 - 1 \\ y \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ \lambda_1 = 1 \\ y = 0 \\ y \leq 1 : \text{vera} \end{cases}$$

il punto $P_1 : (1, 0)$, con $\lambda_1 = 1 > 0$ potrebbe essere punto di massimo.

3) caso $\lambda_1 = 0, \lambda_2 \neq 0$:

$$\begin{cases} \Lambda'_x = 2 \neq 0 \\ \Lambda'_y = -1 - \lambda_2 = 0 \\ y = 1 \\ x^2 - 1 \leq y \end{cases} \text{ non ci sono soluzioni.}$$

4) caso $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0$:

$$\begin{cases} \Lambda'_x = 2 - 2\lambda_1 x = 0 \\ \Lambda'_y = -1 + \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ y = x^2 - 1 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 - 2\lambda_1 x = 0 \\ -1 + \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ x = \sqrt{2} \\ y = 1 \end{cases} \cup \begin{cases} 2 - 2\lambda_1 x = 0 \\ -1 + \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ x = -\sqrt{2} \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 2 - 2\lambda_1 x = 0 \\ -1 + \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ x = \sqrt{2} \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} > 0 \\ \lambda_2 = -1 + \frac{1}{\sqrt{2}} < 0 \\ x = \sqrt{2} \\ y = 1 \end{cases} : \text{il punto } P_2 : (\sqrt{2}; 1), \text{ con } \lambda_1 > 0 \text{ e}$$

$\lambda_2 < 0$ non è ne punto di massimo ne punto di minimo;

$$\begin{cases} 2 - 2\lambda_1 x = 0 \\ -1 + \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ x = -\sqrt{2} \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} < 0 \\ \lambda_2 = -1 - \frac{1}{\sqrt{2}} < 0 \\ x = -\sqrt{2} \\ y = 1 \end{cases} : \text{il punto } P_3 : (-\sqrt{2}; 1), \text{ con } \lambda_1 < 0$$

e $\lambda_2 < 0$ potrebbe essere punto di minimo.

Avendo trovato un solo candidato sia per il punto di massimo che per quello di minimo, il punto $P_1 : (1, 0)$, con $f(1, 0) = 3$ è il punto di massimo mentre il punto $P_3 : (-\sqrt{2}; 1)$, con $f(-\sqrt{2}; 1) = -2\sqrt{2}$ è il punto di minimo.

Se, tanto per completezza, studiamo la funzione sulla frontiera di $\mathcal{E}$, esaminiamo i punti dei due vincoli:

se $y = 1 \Rightarrow f(x, 1) = 2x - 1 + 1 = 2x$ funzione strettamente crescente;

se $y = x^2 - 1 \Rightarrow f(x, x^2 - 1) = 2x - x^2 + 1 + 1 = -x^2 + 2x + 1$;

da $f(x) = -x^2 + 2x + 1 \Rightarrow f'(x) = -2x + 2 \geq 0$ per $x \leq 1$ e quindi si ritrovano un punto di massimo in $x = 1$ ed un punto di minimo in $x = -\sqrt{2}$.

II M 2) Data $f(x, y) = 3x^2 + y^2 - 3xy + 3y$, si analizzi la natura dei suoi punti stazionari.

La funzione è una funzione differenziabile. Applicando le condizioni del I ordine si ha:

$$\nabla f(x, y) = \mathbb{O} \Rightarrow \begin{cases} f'_x = 6x - 3y = 0 \\ f'_y = 2y - 3x + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x \\ 4x - 3x + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -6 \end{cases}.$$

Abbiamo un solo punto stazionario: $P_0 : (-3, -6)$.

Da $\mathbb{H}(x, y) = \mathbb{H}(-3, -6) = \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix}$ otteniamo:

$$\begin{cases} |\mathbb{H}_1| = 6 > 0 \\ |\mathbb{H}_2| = \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 12 - 9 = 3 > 0 \end{cases}.$$

Ne segue che $(-3, -6)$ è un punto di minimo.

II M 3) Tra tutte le soluzioni del sistema di equazioni differenziali: $\begin{cases} x' = x + y + e^t \\ y' = -x - y \end{cases}$ si de-

termini quella per cui $\begin{cases} x(0) = 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$.

Scriviamo il sistema nella forma $\begin{cases} x' - x - y = e^t \\ x + y' + y = 0 \end{cases}$ e quindi, passando alla forma matriciale:

$$\begin{vmatrix} D-1 & -1 \\ 1 & D+1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^t \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} D-1 & -1 \\ 1 & D+1 \end{vmatrix} (x) = \begin{vmatrix} e^t & -1 \\ 0 & D+1 \end{vmatrix} \Rightarrow \\ \Rightarrow (D^2 - 1 + 1)(x) = (D^2)(x) = (D+1)(e^t) + 0 = e^t + e^t = 2e^t.$$

Quindi l'equazione sarà: $x'' = 2e^t$.

Risolvendo l'equazione omogenea, da $D^2 = 0$ abbiamo la soluzione doppia $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ per cui la soluzione generale dell'equazione omogenea sarà $x(t) = c_1 + c_2 t$.

Per trovare una soluzione particolare dell'equazione non omogenea, visto il termine noto, dovremo ipotizzare una soluzione del tipo $x_0(t) = ke^t$.

Sarà: $x'_0(t) = x''_0(t) = ke^t$ e quindi, andando a sostituire nella $x'' = 2e^t$ otteniamo:

$ke^t = 2e^t \Rightarrow k = 2$ e quindi la soluzione dell'equazione non omogenea:

$$x(t) = c_1 + c_2 t + 2e^t.$$

Potevamo operare anche in altro modo:

$$\text{da } x''_0(t) = 2e^t \Rightarrow x'_0(t) = \int 2e^t dt + k = 2e^t + k \Rightarrow x_0(t) = \int 2e^t + k dt + m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_0(t) = 2e^t + kt + m. \text{ Posto } m = c_1 \text{ e } k = c_2 \text{ si ritrova la precedente soluzione.}$$

Dalla prima equazione $x' = x + y + e^t$ ricaviamo $y = x' - x - e^t$ e quindi:

$$y(t) = c_2 + 2e^t - c_1 - c_2 t - 2e^t - e^t = -c_1 + c_2 - c_2 t - e^t$$

e quindi la soluzione generale del sistema sarà:

$$\begin{cases} x(t) = c_1 + c_2 t + 2e^t \\ y(t) = -c_1 + c_2(1-t) - e^t \end{cases}.$$

Dalla $\begin{cases} x(0) = 1 \\ y(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 + 2 = 1 \\ -c_1 + c_2 - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = -1 \\ c_2 = 0 \end{cases}$ da cui la soluzione particolare:

$$\begin{cases} x(t) = -1 + 2e^t \\ y(t) = 1 - e^t \end{cases}.$$

II M 4) Se $\mathbb{Q} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x^2 \leq y \leq x\}$, calcolare $\int \int_{\mathbb{Q}} x y \, dx \, dy$.

Vista la regione di integrazione $\mathbb{Q} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x^2 \leq y \leq x\}$, normale rispetto all'asse x , da $y = x$ segue $x^2 = x$ da cui otteniamo $x = 0$ e $x = 1$ ed avremo:

$$\begin{aligned} \int \int_{\mathbb{Q}} x y \, dx \, dy &= \int_0^1 \int_{x^2}^x x y \, dy \, dx = \int_0^1 x \left(\frac{y^2}{2} \Big|_{x^2}^x \right) dx = \int_0^1 x \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{2} \, dx = \left(\frac{x^4}{8} - \frac{x^6}{12} \Big|_0^1 \right) = \frac{1}{8} - \frac{1}{12} = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$