

Università degli Studi di Siena

Correzione Prova scritta di Matematica Generale (A.A. 2025-26)

12 ottobre 2026

Compito 01

- 1) (6 punti) Siano p, q e r tre proposizioni semplici, determinare la verità o falsità della proposizione composta $(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)$ sapendo che la proposizione composta $p \Rightarrow (q \wedge r)$ è vera.

- 1) *Primo Metodo (Tramite la Tavola di Verità)*: costruiamo la Tavola di Verità della proposizione composta $p \Rightarrow (q \wedge r)$ e la tavola di verità della proposizione composta $(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)$ solo nei casi in cui la precedente proposizione è vera:

p	q	r	$q \wedge r$	$p \Rightarrow (q \wedge r)$	$p \Rightarrow q$	$p \Rightarrow r$	$(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F			
V	F	V	F	F			
V	F	F	F	F			
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V	V
F	F	F	F	V	V	V	V

Come è facile verificare dall'ultima colonna della Tavola di Verità, la proposizione proposta $(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)$ è vera se la proposizione composta $p \Rightarrow (q \wedge r)$ è vera.

Secondo Metodo (Tramite il ragionamento logico): se $p \Rightarrow (q \wedge r)$ allora p è falsa oppure p, q e r sono tre proposizioni vere, ma se p è falsa oppure p, q e r sono tutte e tre vere, $p \Rightarrow q$ e $p \Rightarrow r$ sono entrambe vere e di conseguenza $(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)$ è vera.

- 2) (8 punti) Siano date le funzioni: $f(x) = \sqrt[3]{1+x}$, $g(x) = e^x$ e $h(x) = x+1$.
Determinare le espressioni delle funzioni composte $f(g(x))$, $g(f(x))$, $g(h(x))$ e $f(f(g(x)))$.

$$2) f(g(x)) = f(e^x) = \sqrt[3]{1+e^x}; g(f(x)) = g(\sqrt[3]{1+x}) = e^{\sqrt[3]{1+x}};$$

$$g(h(x)) = g(x+1) = e^{x+1}; f(f(g(x))) = f(\sqrt[3]{1+e^x}) = \sqrt[3]{1+\sqrt[3]{1+e^x}}.$$

- 3) (6 punti) Sia data la funzione $f(x) = \begin{cases} a & \text{se } x \leq -2 \\ x^2 + 1 & \text{se } -2 < x < 1. \\ x + b & \text{se } 1 \leq x \end{cases}$. Calcolare i valori

dei parametri a e b che rendono la funzione continua sull'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$.

- 3) La funzione proposta è palesemente continua nell'insieme $\mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$; per studiare la continuità nei punti -2 e 1 andiamo a calcolare i limiti destro e sinistro della funzione in questi due punti:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} x^2 + 1 = 5, \text{ quindi } f \text{ è continua nel punto } -2 \text{ se e solo se } a = 5;$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + 1 = 2 \text{ e}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x + b = 1 + b, \text{ di conseguenza } f \text{ è continua nel punto } 1 \text{ se e solo se } 1 + b = 2 \text{ ovvero } b = 1.$$

- 4) (8 punti) Calcolare i seguenti limiti: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{9^x - 3^x}{x}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^2 x}{1 + \log^2 x}$.

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9^x - 3^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9^x - 1}{x} - \frac{3^x - 1}{x} = \log 9 - \log 3 = \log \frac{9}{3} = \log 3.$$

Il limite proposto può essere risolto anche tramite l'utilizzo del Teorema di De

L'Hôpital, infatti $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{9^x - 3^x}{x} = \frac{(\rightarrow 0)}{(\rightarrow 0)}$ FI. Applichiamo il Teorema:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{9^x - 3^x}{x} \xrightarrow{H} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9^x \cdot \log 9 - 3^x \cdot \log 3}{1} = \frac{(\rightarrow 1) \cdot \log 9 - (\rightarrow 1) \cdot \log 3}{1} = \log 9 - \log 3 = \log 3.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^2 x}{1 + \log^2 x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^2 x}{\log^2 x \left(\frac{1}{\log^2 x} + 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{\log^2 x} + 1} = \frac{1}{(\rightarrow 0) + 1} = 1.$$

Il limite proposto può essere risolto anche tramite l'utilizzo del Teorema di De

L'Hôpital, infatti $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^2 x}{1 + \log^2 x} = \frac{(\rightarrow \infty)}{(\rightarrow \infty)}$ FI. Applichiamo il Teorema:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^2 x}{1 + \log^2 x} \xrightarrow{H} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot \log x \cdot \frac{1}{x}}{2 \cdot \log x \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1.$$

5) (10 punti) Determinare l'andamento del grafico della funzione di equazione

$$y = \frac{1}{x^2} - 2x.$$

5) C.E.: $x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$, C.E. = $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Eventuali simmetrie: $y(-x) = \frac{1}{(-x)^2} - 2(-x) = \frac{1}{x^2} + 2x$, $y(-x)$ è diversa

sia da $y(x)$ che da $-y(x)$, funzione né pari, né dispari.

Segno ed intersezioni con gli assi: $\frac{1}{x^2} - 2x > 0 \Rightarrow \frac{1 - 2x^3}{x^2} > 0 \Rightarrow$

$1 - 2x^3 > 0 \Rightarrow x^3 < \frac{1}{2} \Rightarrow x < \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$. Funzione positiva in $] -\infty, 0[$ e in

$\left] 0, \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \right[$, funzione negativa in $\left] \sqrt[3]{\frac{1}{2}}, +\infty \right[$. Unica intersezione con gli assi nel punto $A\left(\sqrt[3]{\frac{1}{2}}, 0\right)$.

Limiti agli estremi del C.E.:

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2} - 2x = (\rightarrow 0) - 2(\rightarrow \pm\infty) = \mp\infty$; la funzione non presenta asintoti orizzontali.

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{1}{x^2} - 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^3} - 2 = (\rightarrow 0) - 2 = -2$.


$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y - (-2)x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2} - 2x + 2x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2} = 0$; la funzione presenta asintoto obliquo completo di equazione $y = -2x$.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} - 2x = (\rightarrow +\infty) - (\rightarrow 0) = +\infty$; la funzione presenta asintoto verticale di equazione $x = 0$.

Crescenza e decrescenza: $y' = -\frac{2}{x^3} - 2 = -\frac{2+2x^3}{x^3}$. $y' > 0$ se $\frac{2+2x^3}{x^3} < 0$.

Disequazione fratta, studiamo separatamente numeratore e denominatore:


$\mathcal{N}$: $2+2x^3 > 0 \Rightarrow x^3 > -1 \Rightarrow x > -1$; $\mathcal{D}$: $x^3 > 0 \Rightarrow x > 0$, come facilmente si evince dal grafico qui sotto, la frazione è minore di zero se $-1 < x < 0$.



Funzione strettamente crescente in $[-1, 0[$, strettamente decrescente in $] -\infty, -1]$ e in $]0, +\infty[$. Punto di minimo relativo in $B(-1, 3)$.

Concavità e convessità: $y'' = \frac{6}{x^4}$. $y'' > 0$, $\forall x \in C.E.$. Funzione convessa in $] -\infty, 0[$ e in $]0, +\infty[$. La funzione non presenta punti di flesso.

Grafico (in rosso l'asintoto verticale, in giallo l'asintoto obliquo):



6) (8 punti) Calcolare l'integrale definito $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cdot \cos x \, dx$.

$$6) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cdot \cos x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \, d\sin x = \left(\frac{1}{3} \sin^3 x \right)_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 0 = \frac{1}{3} \cdot 1^3 - \frac{1}{3} \cdot 0^3 = \frac{1}{3}.$$

7) (6 punti) Sia data la funzione di equazione $y = k(1+x^2) + \log(1+mx)$.

Determinare i valori dei parametri k e m sapendo che la retta tangente al grafico della funzione nel punto $x_0 = 0$ ha equazione $y = x$.

7) La retta tangente al grafico della funzione nel punto $x_0 = 0$ ha generica equazione $y = y(0) + y'(0) \cdot x$, se la retta tangente nel punto richiesto è $y = x$, allora $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$. Calcoliamo la funzione e la sua derivata nel punto:

$$y(0) = k + \log 1 = k, \text{ quindi } k = 0; \quad y' = \frac{m}{1 + mx} \text{ con } y'(0) = m, \text{ da cui}$$

facilmente segue $m = 1$.

8) (8 punti) Calcolare le derivate parziali della funzione

$$f(x, y, z, w) = x^2 + w^3 - \frac{1}{y + z}.$$

$$8) \quad f'_x = 2x; \quad f'_y = f'_z = \frac{1}{(y + z)^2}; \quad f'_w = 3w^2.$$